



DR. ARTURO HENRÍQUEZ
CIRUGÍA AMBULATORIA

Mamoplastia de aumento con implantes

Información del procedimiento paso a paso

- El paciente debe llegar una hora antes de la hora programada para el procedimiento, habitualmente se solicitan 6 horas de ayuno, pero esto puede variar y se indica en cada caso.
- Luego de su llegada se verificará que tenga todos sus exámenes, ficha clínica y consentimientos.

- Se tomarán fotos preoperatorias y se harán las marcas necesarias para la cirugía.
- Se le administrarán sedantes y analgésicos por vía oral, intramuscular o endovenosa.

- Durante el procedimiento el paciente se encuentra despierto, a veces con tendencia al sueño, pero despierta fácilmente y respira por sí mismo.

- Se procederá a hacer incisiones de 2 mm en los puntos definidos para entrada de la cánula de infiltración de la anestesia local.
- Luego se procederá a infiltrar la solución de anestesia local en las áreas a tratar.

- Posteriormente se procede a realizar la incisión necesaria, generalmente en el surco submamario u otro que ha sido definido previamente con la paciente. Luego se completa la disección del espacio donde se colocará el implante y se completa la cirugía.

- Habitualmente el procedimiento, puede durar entre una a una hora y media.

- Una vez finalizado el procedimiento, el paciente sigue sin dolor por efecto de la anestesia local que puede durar aproximadamente 12 horas.
- La paciente se va a su domicilio cubierta con apósitos y vendas o sostenes suavemente compresivos.

- En general desde su llegada a retiro pueden pasar un tiempo de entre dos a 4 horas.
(tiempo preoperatorio, operatorio y postoperatorio)

- La paciente debe acudir habitualmente dentro de 72 horas a control, y habitualmente desde esa fecha no debe usar sostén por uno o dos meses para permitir el descenso y posicionamiento final de los implantes

- Pueden aparecer equimosis (moretones) que se resolverán en una a tres semanas

- especialmente la primera semana habrá edema en las mamas y/o región submamaria, este desaparecerá en tres a cuatro semanas.

- Es muy importante que acuda a los controles que se le indican.

- Los resultados pueden apreciarse en forma inmediata, pero va a mejorar en el transcurso de las semanas una vez que se fundan los edemas y los implantes tomen su posición final.